


आइये जानें



समझदासी दिखाएँ!
अपने बच्चे का
सम्पूर्ण टीकाकरण करवाएँ

आई.एल.आर. में वैक्सीन भंडारण

जम चुकी
हेप बी, डी.पी.टी.,
पेंटावेलंट, आई.पी.वी
तथा टी.टी. की वायलों
का कदापि इस्तेमाल
न करें।

8°C

वैक्सीन भंडारण का क्रम

हेपेटाइटिस बी
पेंटावेलंट
डी.पी.टी., आई.पी.वी
टी.टी.,
बी.सी.जी., जे.ई.
खसरा
ओ.पी.वी

(ऊपर से नीचे)

2°C

- सभी प्रकार की वैक्सीन को आई.एल.आर. के भीतर टोकरीयों में रखें।
- थर्मामीटर को टोकरी के भीतर रखें तथा तापमान को +2 से +8 डिग्री

सेंटीग्रेड के बीच में नियंत्रित करें। प्रत्येक दिन में दो बार (सुबह एवं शाम) तापमान की जांच अवश्य करें।

- वैक्सीन के डिब्बों के बीच हवा के आवागमन हेतु स्थान छोड़ें।

- अगले सत्र दिवस पर वितरित किए जाने वाले डाइल्यूएंट का भंडारण भी 24 घंटे पूर्व से आई.एल.आर. में ही करें।